

Instrucciones de cuidado en casa

Ictericia en bebés en edad neonatal





Índice

Instrucciones de cuidado en casa - Ictericia en bebés en edad neonatal



Clínica Las Américas Auna está comprometida con el bienestar de tu bebé en edad neonatal luego de su egreso de nuestra institución, es por esta razón que a continuación encontrarás las recomendaciones de cuidado en casa que te permitan identificar oportunamente los signos de alarma y consulta.

Este instructivo es importante que sea leído por los padres y cuidadores del bebé e integrarlo en las rutinas diarias de atención.



¿Qué es la ictericia?

Tu bebé ha sido diagnosticado con ictericia que es una condición que se puede presentar por **incompatibilidad de grupo o factor RH entre el bebé y la madre**, hipoalimentación, infección, céfaloheMATOMAS (sangrado por debajo del cuero cabelludo causado por un parto difícil) o el hecho de nacer prematuro. Entre los signos de esta enfermedad se encuentran: la coloración amarilla de la piel, las escleras y/o las mucosas que generalmente están asociados a coloración oscura de la orina.

Para el tratamiento tu bebé puede requerir fototerapia, transfusión sanguínea o antibióticos en caso de cursar con una infección confirmada.



Recomendaciones generales


- Es importante que el bebé reciba diariamente baños de sol de manera indirecta, procurando que la exposición sea entre las **8:00** y las **10:00 a. m.** y entre las **4:00** y las **5:00 p. m.**, durante un tiempo aproximado de **10 a 15 minutos**. Recuerda que previo a la exposición a la luz se deben proteger el área genital y los ojos del bebé.
- Especialmente durante el primer mes de vida, es importante asegurar que el bebé se alimente regularmente a libre demanda o al menos cada tres horas, de manera que se evite la deshidratación y se garantice una adecuada ganancia de peso.



Signos de alerta

Recuerda estar atenta(o) ante la aparición de cualquiera de los siguientes signos de alarma que te indicarán cuando debes volver a consultar:

- La piel, las escleras y/o la boca, se tornan nuevamente de color amarillo intenso.
- La ictericia está asociada a una temperatura axilar mayor o igual de 38°C.
- Rechaza persistentemente el alimento.
- Hay una pérdida de peso evidente.
- No orina o lo hace en poca cantidad y/o con sangre o color oscuro.
- Presenta deposiciones blancas o claras.
- Si tu bebé presenta llanto intenso e inconsolable (irritabilidad) o somnolencia marcada (que no responda al llamado).



Gestiona tus citas al
(604) 342 10 10
ó a través del código QR.



**Cuidar la vida,
para vivirla mejor,
siempre**

info@lasamericas.com.co

Dg. 75 B # 2A - 80 / 140
Medellín- Colombia
T (604) 342 10 10

clinicalasamericas.com.co

**Clínica
Las Américas**
aluna

VIGILADO Supersalud 

I-NT-7 V.01