

Instrucciones de cuidado en casa
para Sepsis del recién nacido





Índice

[Instrucciones de cuidado en casa - Sepsis del recién nacido](#)



En **Clínica Las Américas Auna** estamos comprometidos con el bienestar de tu bebé prematuro luego de su egreso de nuestra institución, es por esta razón que a continuación encontrarás las recomendaciones de cuidado en casa que te permitan identificar oportunamente los signos de alarma y consulta.

Este instructivo es importante que sea leído por los padres y cuidadores del bebé e integrarlo en las rutinas diarias de atención.



¿Qué es la sepsis del recién nacido?

Tu bebé ha sido diagnosticado con la enfermedad denominada **sepsis del recién nacido** la cual puede ser causada por infección materna, ruptura prematura de membranas, onfalitis (infección del ombligo y los tejidos que lo rodean), y/o higiene inadecuada de las manos. Entre los síntomas de manifestación están la dificultad respiratoria, temperatura axilar mayor o igual a 38° C, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, inapetencia y/o intolerancia a la alimentación.

Para su tratamiento tu bebé requerirá del uso de antibióticos además puede requerir diferentes terapias de acuerdo con el compromiso del estado general de su salud.



Recomendaciones generales

- Realiza una adecuada higiene de las manos antes de cada manipulación del bebé.
- Prefiere siempre la lactancia materna.
- Continúa con el esquema de vacunación indicado por el pediatra.
- Evita el contacto con personas enfermas o inmunosuprimidas.
- Vigila que el bebé mantenga una temperatura corporal entre 36,5 y 37,5°C, si se encuentra por debajo o encima de estos valores, evalúa qué tan abrigado o descubierto está y ofrécele medidas de confort.
- Restringe visitas innecesarias.
- No manipules el celular mientras estas en contacto con el bebé, ya que se considera una fuente alta de contaminación.



Signos de alerta

Recuerda estar atenta(o) ante la aparición de cualquiera de los siguientes signos de alarma que te indicarán cuando debes volver a consultar:

- Temperatura igual o mayor de 38° C.
- Inapetencia o rechazo a la alimentación.
- No duerme bien o permanece irritable.
- Presenta piel amarilla, moteada o color cenizo.
- Dificultad para respirar.
- Abdomen distendido, duro o doloroso a la palpación.
- Eliminación oscura, con sangre o mal olor.
- Deposiciones fétidas con moco o sangre.
- Tono muscular disminuido (si está flácido) o aumentado (si ofrece resistencia para movilizar las extremidades o el cuello).
- Presenta vómitos o diarrea persistente.



Gestiona tus citas al
(604) 322 79 00
ó a través del código QR.



**Cuidar la vida,
para vivirla mejor,
siempre**

info@lasamericas.com.co

Dg. 75 B # 2A - 80 / 140
Medellín- Colombia
T (604) 342 10 10

clinicalasamericas.com.co

**Clínica
Las Américas**
alana