

# Preparación para enteroscopia de doble balón en la tarde

Atención en videoendoscopia





## Índice

Instrucciones de preparación para el examen





Preparación para enteroscopia de doble balón en la tarde

## Instrucciones de preparación

### Dos días antes del procedimiento:

- Toma dos (2) tabletas de Bisacodilo en la noche.
- Consume una dieta baja en grasas y sin lácteos durante todo el día.

### Un día antes del procedimiento:

- Toma dos (2) tabletas de Bisacodilo en la mañana.
- Consume dieta líquida durante todo el día (Consomé, aromática, gelatina que no sea roja, jugos en agua colados, paleta de agua, gaseosas claras, pedialyte, gatorade, agua, agua saborizada, etc.)
- No tomar bebidas rojas, ni oscuras, ni que contengan leche.

### Siguiente



## Instrucciones de preparación

### Un día antes del procedimiento:

El día anterior a tu procedimiento, debes tomar cuatro (3) sobres de **Nulytelly** o **Kleanprep** o **Travad Colonpeg**, así:

A las **6:00 p.m.** diluye un (1) sobre de **Nulytelly** o **Kleanprep** o **Travad Colonpeg** en un litro de líquido claro (agua, gatorade o gaseosa tipo naranjada, manzana, sprite), tomar un vaso cada 15 ó 20 minutos, y repetir la dilución con los siguientes **dos sobres**, es decir, al final debes tomar **tres (3) sobres de laxante + 3 litros de líquidos.**

Al terminar la toma del laxante, se pueden continuar tomando líquidos claros, es decir, consomé, aromática, gelatina, jugos en



*\*Repetir el proceso con los sobres restantes*

### Preparación para enteroscopia de doble balón en la tarde

agua colados, gaseosas de color claro, pedialyte, gatorade, agua saborizada, etc.

### El día del procedimiento:

- Toma a las **5:00 a.m.** un sobre de **Nulytelly** o **Travad Colon Peg** (diluir en un litro de agua o líquido claro, como el día anterior). **Tómalo hasta las 7:00 a.m. como máximo.**
- A partir de las **7:00 a.m.** no consumas ningún alimento líquido, ni mucho menos sólidos, se requieren seis (6) horas de ayuno previas a la realización del procedimiento.
- Toma 60 gotas de Siligas a las 12:00 a.m (con poca agua), como dosis única.
- Preséntate **una hora antes** directamente en donde te sea informado al momento de confirmación de la cita, con los documentos, historia clínica y estudios previos indicados.
- Debes acudir al procedimiento acompañado por un adulto, en caso de presentarte solo debemos cancelar su realización.



Preparación para enteroscopia de doble balón en la tarde

Para nosotros es grato prestar el servicio, si tienes alguna inquietud sobre el procedimiento favor comunícate con tu médico tratante o con la unidad de videoendoscopia.

**Clínica Las Américas Auna**

**Teléfono: 604 3421010**

**Ext. 1322-1765.**

**Cuidar la vida,  
para vivirla mejor,  
siempre**

[info@lasamericas.com.co](mailto:info@lasamericas.com.co)

Dg. 75 B # 2A - 80 / 140  
Medellín- Colombia  
T (604) 342 10 10

[clinicalasamericas.com.co](http://clinicalasamericas.com.co)

**Clínica  
Las Américas**  
**aluna**

VIGILADO Supersalud 

CLA-I-VD-149 V.01